

## Scintigrafie vyprazdňování žaludku

**Princip:** Vyšetření vyprazdňování žaludku pomocí radiofarmakem značené potravy.

**Radiofarmakum (RF):** 99 mTc sulfurkoloid.

### Indikace:

- posouzení funkční zdatnosti vyprazdňování žaludku
- nejrůznější stavy po chirurgických zákrocích na žaludku, při funkčních a organických poruchách GIT (včetně nauzey a zvracení, průjmu, při významné ztrátě hmotnosti)

**Příprava:** Celonoční lačnění, vysazení všech léků, kromě insulínu a kardiální medicíny, nekouřit.

**Kontraindikace:** Nejsou.

**Technické provedení:** Pacient si přinese s sebou asi 200 ml tuhé stravy (nejlépe rizoto), do níž se na našem oddělení zamíchá radiofarmakum. Tuto směs pacient sní a ihned se provádí 60-ti minutové vyšetření gamakamerou při uložení pacienta na speciálním stole.

**Doba vyšetření:** 60 - 90 minut.

V případě zájmu je možné zaslání popisů, včetně obrazové dokumentace, digitální formou (e-mail, internet, intranet).

**Upozornění:** K žádance přiložte opis předcházejících radiologických vyšetření (UZ, CT, MRI) a dalších pomocných vyšetření.

